


# 令和7年度 ウチノ海環境調査（4月2日調査） 徳島県水産研究課

St.	採水時刻	採水層 (m)	水温 (°C)	塩分	透明度 (m)	細胞/ml		細胞/L	
						ユーカンピア ゾディアクス	コシノディスカス ワイレシー	コシノディスカス spp.	
1	09:38	0-5			5.9	-	-	-	
		0	10.52	32.24					
		1	10.53	32.23					
		5	10.52	32.26					
		10							
		B-1	10.52	32.25					
2	09:44	0-5			8.5	-	-	-	
		0	10.77	32.35					
		1	10.76	32.36					
		5	10.83	32.43					
		B-1	10.82	32.44					
3'	09:50	0-5			9.0	-	-	-	
		0	10.83	32.36					
		1	10.84	32.37					
		5	10.82	32.38					
		10	10.82	32.49					
		B-1	10.82	32.49					
4	09:57	0-5			9.0	-	-	-	
		0	10.95	32.34					
		1	10.91	32.33					
		5	10.78	32.38					
		10	10.79	32.49					
B-1	10.80	32.49							
5	10:04	0-5			9.3	-	-	-	
		0	10.79	32.27					
		1	10.80	32.28					
		5	10.88	32.32					
		10	10.96	32.43					
		B-1	10.92	32.44					
6	10:14	0-5			9.5	-	-	-	
		0	10.99	32.34					
		1	10.98	32.34					
		5	10.97	32.35					
		10	11.17	32.40					
		B-1	10.96	32.44					



**備考**

- ・藻類を色落ちさせる珪藻のコシノディスカス属及びユーカンピア属は検出されませんでした。
- ・珪藻は非常に低密度で前回調査時から減少しました。  
珪藻細胞密度 St.5(0-5m): 0 cells/ml