


令和7年度 ウチノ海環境調査 (4月17日調査) 徳島県水産研究課

St.	採水時刻	採水層 (m)	水温 (°C)	塩分	透明度 (m)	カレニア ミキモトイ	備考
1	09:16	0-5			10.6	-	
		0	12.34	32.37			
		1	12.23	32.41			
		5	11.81	32.43			
		10	11.78	32.42			
		B-1	11.79	32.43			
2	09:24	0-5			7.5	-	
		0	12.85	32.43			
		1	12.77	32.43			
		5	12.33	32.40			
		B-1	12.31	32.41			
3'	09:30	0-5			8.9	-	
		0	13.20	32.43			
		1	13.02	32.41			
		5	12.53	32.47			
		B-1	12.36	32.51			
4	09:39	0-5			9.8	-	
		0	13.32	32.43			
		1	12.94	32.39			
		5	12.64	32.43			
		B-1	12.37	32.51			
5	09:45	0-5			9.3	-	
		0	12.66	32.39			
		1	12.54	32.38			
		5	12.11	32.39			
		B-1	12.36	32.48			
6	09:55	0-5			9.5	-	
		0	12.65	32.40			
		1	12.55	32.41			
		5	12.44	32.42			
		B-1	12.27	32.50			



備考

- ・有害種は検出されませんでした。
- ・珪藻はキートセロス属主体で低密度でした。
珪藻細胞密度 : 15cells/ml (St.5 0-5m)