


令和7年度 北灘 環境調査（4月10日調査）徳島県水産研究課

St.	採水時刻	採水層 (m)	水温 (℃)	塩分	透明度 (m)	細胞/L		細胞/mL	
						コシノディスカス ワイレシー	コシノディスカス spp.	ユーカンピア ゾディアクス	アレキサンドリウム sp.
2	09:39	0-5			11.0	-	10	-	-
		0	12.52	32.12					
		1	12.31	32.08		-	10	-	-
		5	12.07	31.86		-	-	-	-
		10	11.67	32.10		-	-	-	-
		15	11.43	32.11					
		20	11.14	32.11					
		B-1	10.57	32.51		-	20	-	-
4	09:01	0-5			13.5	-	-	-	-
		0	12.25	32.11		-	-	-	-
		1	12.22	32.09		-	-	-	-
		5	11.75	32.15		-	-	-	-
		10	11.51	32.17		-	-	-	-
		15	10.91	32.21					
		20	10.57	32.43		-	-	-	-
		25	10.84	32.58					
		30	10.66	32.59		-	-	-	-
		35	10.61	32.59					
		40	10.56	32.59					
		B-1	10.56	32.59		-	-	-	-
5	10:13	0-5			13.1	-	-	-	-
		0	12.29	32.15					
		1	12.16	32.14		-	-	-	-
		5	11.84	32.14		-	-	-	-
		10	11.51	32.13		-	-	-	-
		15	11.32	32.15					
		20	10.83	32.26					
		25	10.80	32.45					
		30	10.82	32.54					
		B-1	10.86	32.60		10	-	-	-



備考

・藻類を色落ちさせる珪藻について、コシノディスカス属が検出されましたが低密度でした。

・麻痺性貝毒原因種を含むアレキサンドリウム属は検出されませんでした。

・珪藻はレプトキリンドルス属主体で低密度でした。

珪藻細胞数 St.4(0-5m)：34cells/ml