

令和7年度発生予察月報(4月)

徳島県立農林水産総合技術支援センター
病虫害防除所

I. 気象概況

(徳島地方気象台観測値)

	平均気温(℃)			降水量(mm)			日照時間(h)		
	本年	平年	差	本年	平年	差	本年	平年	差
上旬	13.5	13.3	+0.2	7.5	33.0	-25.5	67.7	64.2	+3.5
中旬	15.8	15.1	+0.7	21.5	35.9	-14.4	73.6	66.0	+7.6
下旬	18.5	16.6	+1.9	15.0	35.5	-20.5	48.8	67.8	-19.0

※平年値の統計期間は1991年～2020年の30年間です。

※本年下旬の値は4/21-4/27のデータで計算しています(4/28,29,30のデータは入っていません)。

II. 病虫害の発生状況

[普通作物]

早期イネ

徳島市、小松島市、阿南市、美波町、海陽町調査: 4/25

病虫害名	発生程度別圃場数						発生圃場率(%)	発生程度指数*	調査項目及び発生の特徴
	無	少	中	多	甚	合計			
イネミスソウムシ	6	2	2	0	0	10	40.0	15.0	虫数/25株(頭): 1.6
(東部沿岸)	6	2	1	0	0	9	33.3	11.1	1.0
(南部)	0	0	1	0	0	1	100.0	50.0	7.0
イネソウムシ	6	4	0	0	0	10	40.0	10.0	虫数/25株(頭): 1.1

東部沿岸 : 徳島市(川内町)、小松島市(立江町)、阿南市(中林町、福井町、長生町、新野町、那賀川町)

南部 : 美波町、海陽町

[果樹]

ナシ

鳴門市、松茂町調査: 4/25

病虫害名	発生程度別圃場数						発生圃場率(%)	発生程度指数*	調査項目及び発生の特徴
	無	少	中	多	甚	合計			
黒星病	7	0	0	0	0	7	0.0	0.0	発病葉率(%): 0.0
〃	7	0	0	0	0	7	0.0	0.0	発病果率(%): 0.0
赤星病	5	2	0	0	0	7	28.6	7.1	発病葉率(%): 0.6

[野 菜]

冬春トマト

阿波市調査: 4/24

病 害 虫 名	発 生 程 度 別 圃 場 数						発生圃 場率(%)	発生程 度指数*	調査項目及び発生の特徴
	無	少	中	多	甚	合計			
疫 病	7	0	0	0	0	7	0.0	0.0	発 病 度 : 0.0
灰 色 か び 病	7	0	0	0	0	7	0.0	0.0	発 病 葉 率 (%) : 0.0
〃	7	0	0	0	0	7	0.0	0.0	発 病 果 率 (%) : 0.0
葉 か び 病	7	0	0	0	0	7	0.0	0.0	発 病 度 : 0.0
アブラムシ類	7	0	0	0	0	7	0.0	0.0	寄 生 株 率 (%) : 0.0
タバココナシラミ	2	4	1	0	0	7	71.4	21.4	1葉当たり寄生成虫数(頭): 3.6
〃	2	4	0	0	1	7	71.4	28.6	寄 生 葉 率 (%) : 20.6
オンシツコナシラミ	7	0	0	0	0	7	0.0	0.0	1葉当たり寄生成虫数(頭): 0.0
〃	7	0	0	0	0	7	0.0	0.0	寄 生 葉 率 (%) : 0.0
すすかび病	7	0	0	0	0	7	0.0	0.0	発 病 株 率 (%) : 0.0
うどんこ病	5	2	0	0	0	7	28.6	7.1	発 病 株 率 (%) : 2.4
黄化葉巻病	7	0	0	0	0	7	0.0	0.0	発 病 株 率 (%) : 0.0

冬春ナス

吉野川市、阿波市調査: 4/24、25

病 害 虫 名	発 生 程 度 別 圃 場 数						発生圃 場率 (%)	発生程 度指数*	調査項目及び発生の特徴
	無	少	中	多	甚	合計			
灰 色 か び 病	3	3	0	0	0	6	50.0	12.5	発 病 葉 率 (%) : 0.5
〃	5	1	0	0	0	6	16.7	4.2	発 病 果 率 (%) : 0.2
うどんこ病	5	0	1	0	0	6	16.7	8.3	発 病 葉 率 (%) : 7.2
〃	5	1	0	0	0	6	16.7	4.2	発 病 度 : 1.8
すすかび病	4	2	0	0	0	6	33.3	8.3	発 病 葉 率 (%) : 1.5
〃	4	2	0	0	0	6	33.3	8.3	発 病 度 : 0.4
アブラムシ類	6	0	0	0	0	6	0.0	0.0	寄 生 葉 率 (%) : 0.0
〃	6	0	0	0	0	6	0.0	0.0	1葉当たり寄生成虫数(頭): 0.0
アザミウマ類	5	0	0	1	0	6	16.7	12.5	寄 生 葉 率 (%) : 6.7
〃	5	0	0	1	0	6	16.7	12.5	被 害 果 率 (%) : 4.0
オンシツコナジラミ	6	0	0	0	0	6	0.0	0.0	成 虫 寄 生 葉 率 (%) : 0.0
タバココナジラミ	0	3	1	1	1	6	100.0	50.0	成 虫 寄 生 葉 率 (%) : 38.3
ハダニ類	3	2	0	1	0	6	50.0	20.8	寄 生 葉 率 (%) : 9.7
黒 枯 病	6	0	0	0	0	6	0.0	0.0	発 病 度 : 0.0

冬春キュウリ

小松島市、阿南市、海陽町調査：4/24、25

病 害 虫 名	発 生 程 度 別 圃 場 数						発生圃 場率(%)	発生程 度指数*	調査項目及び発生の特徴
	無	少	中	多	甚	合計			
べ と 病	2	4	2	1	0	9	77.8	30.6	発 病 葉 率 (%) : 18.2
う ど ん こ 病	6	2	0	1	0	9	33.3	13.9	発 病 葉 率 (%) : 9.6
褐 斑 病	7	0	2	0	0	9	22.2	11.1	発 病 葉 率 (%) : 2.0
〃	7	0	2	0	0	9	22.2	11.1	発 病 度 : 2.0
灰 色 か び 病	9	0	0	0	0	9	0.0	0.0	寄 生 果 率 (%) : 0.0
アブラムシ類	9	0	0	0	0	9	0.0	0.0	寄 生 葉 率 (%) : 0.0
〃	9	0	0	0	0	9	0.0	0.0	1葉あたり生息数(頭) : 5.8
アザミウマ類	4	0	1	3	1	9	55.6	41.7	寄 生 葉 率 (%) : 21.0
〃	7	1	0	0	1	9	22.2	13.9	被 害 果 率 (%) : 5.8
タバココナジラミ	5	3	1	0	0	9	44.4	13.9	寄 生 葉 率 (%) : 7.2
疫病(立枯性)	9	0	0	0	0	9	0.0	0.0	発 病 株 率 (%) : 0.0
つ る 枯 病	9	0	0	0	0	9	0.0	0.0	発 病 株 率 (%) : 0.0

夏ネギ

徳島市調査：4/25

病 害 虫 名	発 生 程 度 別 圃 場 数						発生圃 場率 (%)	発生程 度指数*	調査項目及び発生の特徴
	無	少	中	多	甚	合計			
さ び 病	9	0	0	0	0	9	0	0	発 病 株 率 (%) : 0.0
べ と 病	9	0	0	0	0	9	0	0	発 病 株 率 (%) : 0.0
ネギアザミウマ	1	4	4	0	0	9	88.9	33.3	被 害 度 : 7.4
ハスモンヨトウ	8	1	0	0	0	9	11.1	2.8	寄 生 株 率 (%) : 0.2
シロイチモジヨトウ	9	0	0	0	0	9	0.0	0.0	寄 生 株 率 (%) : 0.0
〃	9	0	0	0	0	9	0.0	0.0	寄 生 虫 数 (頭) : 0.0
ネギハモグリバエ	7	2	0	0	0	9	22.2	5.6	被 害 度 : 0.2

注1)発生程度指数*は以下の式より求めている。

$$\text{発生程度指数} = \frac{(\text{少} \times 1 + \text{中} \times 2 + \text{多} \times 3 + \text{甚} \times 4)}{\text{調査圃場数} \times 4} \times 100$$

各種フェロモントラップ




図1 ナシヒメシンクイムシ フェロモントラップ誘殺数推移
※鳴門市、松茂町の7地点平均




図2 ナシヒメシンクイムシ フェロモントラップ誘殺数推移
※無防除圃場(農総技支センター上板)




図3 3種果樹カメムシ類(チャバネアオカメムシ、ツヤアオカメムシ、クサギカメムシ)フェロモントラップ誘殺数(石井町)




図4 予察灯による果樹カメムシ類(チャバネアオカメムシ、ツヤアオカメムシ、クサギカメムシ)の誘殺数(勝浦町)




図5 予察灯による果樹カメムシ類(チャバネアオカメムシ、ツヤアオカメムシ、クサギカメムシ)の誘殺数(上板町)




図6 オオタバコガ フェロモントラップ誘殺数推移
*阿波市・三好市・東みよし町・石井町の6地点平均