

注 意 報

農技セ第5504号
令和7年5月15日

各関係機関長 殿

徳島県立農林水産総合技術支援センター
病虫害防除所長
(公印省略)

令和7年度農作物病虫害発生予察情報について

令和7年度農作物病虫害発生予察注意報第1号を発表したので送付します。

令和7年度病虫害発生予察注意報第1号

令和7年5月15日
徳 島 県

5月第1半旬から第2半旬のオオタバコガのフェロモントラップ定点調査において、成虫誘殺数が平年に比べて多く推移していることから、今後、野菜類で幼虫による被害の拡大が予想されますので、注意報を発令します。

生産現場においては、発生状況の把握に努めるとともに、適切な防除指導をお願いいたします。

作物名：野菜類(特に夏秋ナス、雨よけトマト・ミニトマト、
スイートコーン(未成熟とうもろこし)、オクラ)

病虫害名：オオタバコガ

1.発生地域 県内全域

2.発生時期 5月上旬～

3.発生程度 多(前年よりやや多く、平年より多い)

4.注意報発令の根拠

- (1) 県内に設置したフェロモントラップの定点(6地点)調査において、5月第1半旬から第2半旬における平均誘殺数が71.3頭となり、平年(12.8頭)の約5.6倍の発生となった(図1)。
- (2) 高松地方气象台が5月8日に発表した1か月予報では、気温は平年より高く、降水量はほぼ平年並か多く、日照時間は平年並か少ないと予想されており、やや発生助長的な気象条件である。
- (3) 昨年度多発したことに加え、今冬(令和6年12月から令和7年2月)の降水量が少なかったことから本虫の密度が高いと考えられる。今後、高温の影響で次世代虫の多発が予想され、被害多発が懸念される。

5.防除法等

- (1) 被害部位(果実、花蕾)や剪定後の茎葉には卵や幼虫が付着している可能性があるため、圃場外に持ち出し、地中に深く埋める等適切に処分する(図2、3)。
- (2) 果実や茎、花蕾に食入した幼虫や発育が進んだ幼虫に対しては薬効が著しく低下するので、発生初期に薬剤防除を行う。薬剤防除は表1から4を参考に実施する。
- (3) 本虫は作物の花蕾や生長点付近の新葉に1個ずつ産卵するため、寄生部位を注意深く観察してから防除する。
- (4) 今後の発生動向については、農林水産総合技術支援センターウェブページ内、病

害虫防除所の各種データ (<https://www.pref.tokushima.lg.jp/tafftsc/t-boujoshovarious-data/>) を参考にする。

- (5) 防除等の詳細については、徳島県植物防疫指針 (<https://www.nouyaku-sys.com/nouyaku/user/top/tokushima>) を参照するとともに、薬剤の使用に当たっては、必ず農薬ラベル記載事項を遵守する。




図1 オオタバコガ フェロモントラップ誘殺数推移
* 阿波市、三好市、東みよし町、石井町の6地点平均



図2 ナスの上位葉に産下された卵(黄色円内)



図3 オオタバコガ幼虫と食害痕

表 1 ナスでオオタバコガに登録のある農薬
(登録内容：2025年 5 月 1 日現在)

農薬の名称	希釈倍数	使用時期	本剤の使用回数	IRAC コード
スピノエース顆粒水和剤	5,000倍	収穫前日まで	2回以内	5
ディアナSC	2,500～5,000倍	収穫前日まで	2回以内	5
アニキ乳剤	2,000倍	収穫前日まで	3回以内	6
アフーム乳剤	2,000倍	収穫前日まで	2回以内	6
コテツフロアブル	2,000倍	収穫前日まで	4回以内	13
マトリックフロアブル	1,000～2,000倍	収穫前日まで	3回以内	18
プレバソンフロアブル5	2,000倍	収穫前日まで	2回以内	28
フェニックス顆粒水和剤	2,000～4,000倍	収穫前日まで	3回以内	28
グレーシア乳剤	2,000倍	収穫前日まで	2回以内	30
プレオフロアブル	1,000倍	収穫前日まで	4回以内	UN

表 2 トマト、ミニトマトでオオタバコガに登録のある農薬
(登録内容：2025年 5 月 1 日現在)

農薬の名称	希釈倍数	使用時期	本剤の使用回数	IRAC コード
スピノエース顆粒水和剤	5,000倍	収穫前日まで	2回以内	5
ディアナSC	2,500～5,000倍	収穫前日まで	2回以内	5
アニキ乳剤	2,000倍	収穫前日まで	3回以内	6
アフーム乳剤	2,000倍	収穫前日まで	5回以内	6
コテツフロアブル	2,000倍	収穫前日まで	3回以内	13
マトリックフロアブル	1,000～2,000倍	収穫前日まで (ミニトマトは 収穫7日前まで)	3回以内	18
プレバソンフロアブル5	2,000倍	収穫前日まで	3回以内	28
フェニックス顆粒水和剤	2,000～4,000倍	収穫前日まで	2回以内	28
ベネビアOD	2,000～4,000倍	収穫前日まで	3回以内	28
グレーシア乳剤	2,000倍	収穫前日まで	2回以内	30
プレオフロアブル	1,000倍	収穫前日まで	2回以内	UN

表 3 オクラでオオタバコガに登録のある農薬
(登録内容：2025年 5 月 1 日現在)

農薬の名称	希釈倍数	使用時期	本剤の使用回数	IRAC コード
アフーム乳剤	2,000倍	収穫前日まで	2回以内	6
コテツフロアブル	2,000倍	収穫前日まで	2回以内	13
アタブロン乳剤	2,000倍	収穫前日まで	4回以内	15
プレバソンフロアブル5	2,000倍	収穫前日まで	3回以内	28
グレーシア乳剤	2,000倍	収穫前日まで	2回以内	30
プレオフロアブル	1,000倍	収穫前日まで	2回以内	UN

表 4 スイートコーン(未成熟とうもろこし)でオオタバコガに登録のある農薬
(登録内容：2025年5月1日現在)

農薬の名称	希釈倍数	使用時期	本剤の使用回数	IRAC コード
ディアナSC	2,500～5,000倍	収穫前日まで	2回以内	5
アニキ乳剤	1,000倍	収穫前日まで	3回以内	6
アフーム乳剤	1,000～2,000倍	収穫3日前まで	2回以内	6
ベネビアOD	2,000～4,000倍	収穫前日まで	3回以内	28
プレオフロアブル	1,000倍	収穫前日まで	2回以内	UN