


令和7年度 北灘 環境調査 (5月15日調査) 徳島県水産研究課

St.	採水時刻	採水層 (m)	水温 (°C)	塩分	透明度 (m)	細胞/mL		
						アレキサンドリウム sp.	ディノフィシス フォルティ	ディノフィシス アキュミナータ
2	11:26	0-5			9.0	-	-	-
		0	16.96	32.14				
		1	16.61	32.09				
		5	16.03	32.09		0.01	-	-
		10	15.62	32.12		0.07	-	-
		15	15.46	32.16				
		20	15.28	32.19				
		B-1	14.82	32.29				
4	10:54	0-5			9.6	-	-	-
		0	16.46	32.08		0.07	-	-
		1	16.32	32.08		0.01	-	-
		5	15.81	32.11				
		10	15.51	32.13				
		15	15.36	32.17				
		20	15.19	32.23				
		25	14.70	32.36				
		30	13.98	32.53				
		35	13.75	32.55				
		40						
		B-1	13.73	32.55				
5	12:04	0-5			9.9	-	-	-
		0	16.56	32.11				
		1	16.51	32.09				
		5	16.07	32.11				
		10	15.74	32.12		0.01	-	-
		15	15.65	32.13				
		20	15.47	32.18				
		25	15.15	32.31				
		30	15.01	32.33				
B-1	13.82	32.53						



備考

- ・麻痺性貝毒原因種を含むアレキサンドリウム属が検出されましたが低密度でした。
- ・下痢性貝毒原因種のディノフィシス属は検出されませんでした。
- ・珪藻は非常に低密度でした。
珪藻細胞数：1cells/ml (St.4 0-5m)