令和7年度発生予察月報（5月）

徳島県立農林水産総合技術支援センター
病害虫防除所

Ⅰ．気象概況

（徳島地方気象台観測値）

	平均気温(℃)			降水量(mm)			日照時間(h)		
	本年	平年	差	本年	平年	差	本年	平年	差
上旬	18.0	18.6	－0.6	100.0	35.4	＋64.6	68.9	65.7	＋3.2
中旬	20.2	19.3	＋0.9	34.5	58.5	－24.0	49.9	65.5	－15.6
下旬	－	20.8	－	－	52.7	－	－	74.4	－

※本年中旬の値は5/11-5/19 のデータで計算しています(5/20のデータは入っていません)。

Ⅱ．病害虫の発生状況

[普通作物]

早期イネ

徳島市、小松島市、阿南市、美波町、牟岐町、海陽町調査：5/12

病害虫名	発生程度別圃場数						発生圃場率(%)	発生程度指数*	調査項目及び発生の特徴	
	無	少	中	多	甚	合計				
葉いもち	18	0	0	0	0	18	0.0	0.0	発病度：	0.0
（東部沿岸）	14	0	0	0	0	14	0.0	0.0		0.0
（南部）	4	0	0	0	0	4	0.0	0.0		0.0
イネミズゾウムシ	10	7	1	0	0	18	44.4	18.8	虫数/25株（頭）：	2.3
（東部沿岸）	8	5	1	0	0	14	42.9	17.3		2.1
（南部）	2	2	0	0	0	4	50.0	25.0		3.0
イネゾウムシ	18	0	0	0	0	18	0.0	1.6	虫数/25株（頭）：	0.1

東部沿岸：	徳島市(川内町、不動西町)、阿南市(那賀川町、山口町、新野町、長生町、中林町、福井町、見能林町)
	小松島市(櫛渕町、立江町、田野町)
南部：	美波町(西河内)、牟岐町(辺川)、海陽町(四方原、多良)

ムギ

東みよし町、三好市、美馬市調査：5/12

病害虫名	発生程度別圃場数						発生圃場率(%)	発生程度指数*	調査項目及び発生の特徴	
	無	少	中	多	甚	合計				
赤かび病	4	0	0	0	0	4	0.0	0.0	発病穂率(%)：	0.0
うどんこ病	3	1	0	0	0	4	25.0	6.3	基準による%：	0.0

[果 樹]

温州ミカン

徳島市、勝浦町、佐那河内村調査: 5/13

病害虫名	発生程度別圃場数						発生圃場率(%)	発生程度指数*	調査項目及び発生の特徴	
	無	少	中	多	甚	合計				
そうか病	7	1	0	0	0	8	12.5	3.1	春葉の発病程度:	0.0
アブラムシ類	8	0	0	0	0	8	0.0	0.0	寄生新梢率:	0.0
ミカンハダニ	8	0	0	0	0	8	0.0	0.0	旧葉の寄生率:	0.0

スダチ

徳島市、神山町、佐那河内村、勝浦町調査: 5/13

病害虫名	発生程度別圃場数						発生圃場率(%)	発生程度指数*	調査項目及び発生の特徴	
	無	少	中	多	甚	合計				
かいよう病	3	5	0	0	0	8	62.5	15.6	旧葉の発病程度:	2
そうか病	7	1	0	0	0	8	12.5	3.1	春葉の発病程度:	0
アブラムシ類	8	0	0	0	0	8	0.0	0.0	寄生新梢率:	0
ミカンハダニ	8	0	0	0	0	8	0.0	0.0	旧葉の寄生率:	0

ナシ

鳴門市、松茂町調査: 5/13

病害虫名	発生程度別圃場数						発生圃場率(%)	発生程度指数*	調査項目及び発生の特徴	
	無	少	中	多	甚	合計				
黒星病	8	0	0	0	0	8	0.0	0.0	発病葉率(%):	0.0
黒星病	8	0	0	0	0	8	0.0	0.0	発病果率(%):	0.0
アブラムシ類	7	1	0	0	0	8	12.5	3.1	寄生新梢率(%):	0.2
クワコナカイガラムシ	8	0	0	0	0	8	0.0	0.0	寄生結果母枝率(%):	0.0
〃	8	0	0	0	0	8	0.0	0.0	寄生果率(%):	0.0
赤星病	3	4	1	0	0	8	62.5	18.8	発病葉率(%):	2.9

カキ

上板町、つるぎ町、東みよし町調査: 5/12,13

病害虫名	発生程度別圃場数						発生圃場率(%)	発生程度指数*	調査項目及び発生の特徴	
	無	少	中	多	甚	合計				
炭疽病	6	0	0	0	0	6	0	0	新梢発病率(%):	0
カキクダアザミウマ	6	0	0	0	0	6	0	0	被害葉率(%):	0
ハマキムシ類	6	0	0	0	0	6	0	0	被害果率(%):	0

注1)発生程度指数*は以下の式より求めている。

$$\text{発生程度指数} = \frac{(\text{少}\times 1 + \text{中}\times 2 + \text{多}\times 3 + \text{甚}\times 4)}{\text{調査圃場数}\times 4} \times 100$$

各種フェロモントラップ



図1　ナシヒメシンクイムシ　フェロモントラップ誘殺数推移
※鳴門市、松茂町の7地点平均



図2　ナシヒメシンクイムシ　フェロモントラップ誘殺数推移
※無防除圃場（農総技支センター上板）



図3　3種果樹カメムシ類（チャバネアオカメムシ、ツヤアオカメムシ、
クサギカメムシ）フェロモントラップ誘殺数（石井町）



図4　予察灯による果樹カメムシ類(チャバネアオカメムシ、ツヤアオカメムシ、クサギカメムシ)の誘殺数（勝浦町）



図5　予察灯による果樹カメムシ類(チャバネアオカメムシ、ツヤアオカメムシ、クサギカメムシ)の誘殺数（上板町）



図6　オオタバコガ　フェロモントラップ誘殺数推移
*阿波市・三好市・東みよし町・石井町の6地点平均