


令和7年度 ウチノ海環境調査（5月23日調査） 徳島県水産研究課

St.	採水時刻	採水層 (m)	水温 (°C)	塩分	透明度 (m)	細胞/ml
						カレニア ミキモトイ
1	09:07	0-5			7.5	-
		0	18.03	32.37		
		1	18.24	32.08		
		5	17.71	32.08		
		10	17.49	32.15		
		B-1	17.49	32.15		
2	09:12	0-5			6.7	-
		0	17.90	32.14		
		1	17.59	32.15		
		5	17.02	32.40		
		B-1	16.99	32.40		
3'	09:17	0-5			7.2	-
		0	17.82	32.23		
		1	17.75	32.26		
		5	16.97	32.41		
		10	16.85	32.43		
		B-1	16.88	32.42		
4	09:23	0-5			7.0	-
		0	16.88	32.40		
		1	16.85	32.40		
		5	16.78	32.42		
		10	16.77	32.43		
		B-1	16.77	32.43		
5	09:28	0-5			8.3	-
		0	19.06	31.88		
		1	18.10	32.16		
		5	17.15	32.38		
		10	16.67	32.46		
		B-1	16.69	32.46		
6	09:36	0-5			8.1	-
		0	19.23	31.79		
		1	19.06	31.83		
		5	17.79	32.22		
		10	16.74	32.45		
		B-1	16.66	32.47		



備考

- ・有害種は検出されませんでした。
- ・珪藻はシュードニッチア属主体で低密度でした。
珪藻細胞密度 : 246cells/ml (St.5 0-5m)