

令和7年度発生予察月報(5月)

徳島県立農林水産総合技術支援センター
病虫害防除所

I. 気象概況 (徳島地方気象台観測値)

	平均気温(℃)			降水量(mm)			日照時間(h)		
	本年	平年	差	本年	平年	差	本年	平年	差
上旬	18.0	18.6	- 0.6	100.5	35.4	+ 65.1	68.9	65.7	+ 3.2
中旬	20.5	19.3	+ 1.2	34.5	58.5	- 24.0	65.6	65.5	+ 0.1
下旬	20.5	20.8	- 0.3	103.0	52.7	+ 50.3	30.0	74.4	- 44.4

※本年下旬の値は5/21-5/29のデータで計算しています(5/30,31のデータは入っていません)。

II. 病虫害の発生状況

[普通作物]

早期イネ

徳島市、小松島市、阿南市、美波町、牟岐町、海陽町調査: 5/12

病虫害名	発生程度別圃場数						発生圃場率(%)	発生程度指数*	調査項目及び発生の特徴
	無	少	中	多	甚	合計			
葉いもち	18	0	0	0	0	18	0.0	0.0	発病度: 0.0
(東 部 沿 岸)	14	0	0	0	0	14	0.0	0.0	0.0
(南 部)	4	0	0	0	0	4	0.0	0.0	0.0
イネミスヅウムシ	10	7	1	0	0	18	44.4	12.5	虫数 /25 株 (頭): 1.2
(東 部 沿 岸)	8	5	1	0	0	14	42.9	12.5	1.1
(南 部)	2	2	0	0	0	4	50.0	12.5	1.5
イネソウムシ	18	0	0	0	0	18	0.0	0.0	虫数 /25 株 (頭): 0.0

早期イネ

徳島市、小松島市、阿南市、美波町、牟岐町、海陽町調査: 5/23、5/26

病虫害名	発生程度別圃場数						発生圃場率(%)	発生程度指数*	調査項目及び発生の特徴
	無	少	中	多	甚	合計			
葉いもち	18	0	0	0	0	18	0.0	0.0	発病度: 0.0
(東 部 沿 岸)	14	0	0	0	0	14	0.0	0.0	0.0
(南 部)	4	0	0	0	0	4	0.0	0.0	0.0
イネミスヅウムシ	8	9	1	0	0	18	55.6	15.3	虫数 /25 株 (頭): 1.5
(東 部 沿 岸)	7	6	1	0	0	14	50.0	14.3	1.7
(南 部)	1	3	0	0	0	4	75.0	18.8	0.8
イネソウムシ	14	4	0	0	0	18	22.2	5.6	虫数 /25 株 (頭): 0.3

東部沿岸 :	徳島市(川内町、不動西町)、阿南市(那賀川町、山口町、新野町、長生町、中林町、福井町、見能林町) 小松島市(楢瀬町、立江町、田野町)
南 部 :	美波町(西河内)、牟岐町(辺川)、海陽町(四方原、多良)

普通期イネ

上板町、阿波市、美馬市、吉野川市、石井町調査: 5/26

病 害 虫 名	発 生 程 度 別 圃 場 数						発生圃 場率(%)	発生程 度指数*	調査項目及び発生の特徴
	無	少	中	多	甚	合計			
葉 い も ち	12	0	0	0	0	12	0.0	0.0	発 病 度 : 0.0
(北 中 部)	11	0	0	0	0	11	0.0	0.0	0.0
(西 部)	1	0	0	0	0	1	0.0	0.0	0.0
イネミスヅウムシ	7	5	0	0	0	12	41.7	10.4	虫 数 /25 株 (頭): 1.1
(北 中 部)	7	4	0	0	0	11	36.4	9.1	1.0
(西 部)	0	1	0	0	0	1	100.0	25.0	2.0
イネソウムシ	11	1	0	0	0	12	8.3	2.1	虫 数 /25 株 (頭): 0.2

北中部: 板野郡(藍住町、板野町、上板町)、阿波市(吉野町、土成町、市場町)、吉野川市(鴨島町、山川町)、名西郡石井町
西部: 美馬市、東みよし町、三好市

ムギ

東みよし町、三好市、美馬市調査: 5/12

病 害 虫 名	発 生 程 度 別 圃 場 数						発生圃 場率(%)	発生程 度指数*	調査項目及び発生の特徴
	無	少	中	多	甚	合計			
赤 か び 病	4	0	0	0	0	4	0.0	0.0	発 病 穂 率 (%) : 0.0
う ど ん こ 病	3	1	0	0	0	4	25.0	6.3	基 準 に よ る % : 0.0

サツマイモ

徳島市、鳴門市、松茂町調査: 5/26

病 害 虫 名	発 生 程 度 別 圃 場 数						発生圃 場率(%)	発生程 度指数*	調査項目及び発生の特徴
	無	少	中	多	甚	合計			
食 業 性 害 虫	9	1	0	0	0	10	10.0	2.5	被 害 度 : 0.2
イモキバガ	10	0	0	0	0	10	0.0	0.0	被 害 葉 率 (%): 0.0
アブラムシ類	6	4	0	0	0	10	40.0	10.0	寄 生 株 率 (%): 6.8
ハダニ類	10	0	0	0	0	10	0.0	0.0	寄 生 葉 率 (%): 0.0
基 腐 病	10	0	0	0	0	10	0.0	0.0	発 病 面 積 率 (%) 0.0

[果 樹]

温州ミカン

徳島市、勝浦町、佐那河内村調査: 5/13

病 害 虫 名	発 生 程 度 別 圃 場 数						発生圃 場率(%)	発生程 度指数*	調査項目及び発生の特徴
	無	少	中	多	甚	合計			
そ う か 病	7	1	0	0	0	8	12.5	3.1	春 葉 の 発 病 程 度 : 0.0
アブラムシ類	8	0	0	0	0	8	0.0	0.0	寄 生 新 梢 率 : 0.0
ミカンハダニ	8	0	0	0	0	8	0.0	0.0	旧 葉 の 寄 生 率 : 0.0

スダチ

徳島市、神山町、佐那河内村、勝浦町調査: 5/13

病 害 虫 名	発 生 程 度 別 圃 場 数						発生圃 場率(%)	発生程 度指数*	調査項目及び発生の特徴
	無	少	中	多	甚	合計			
か い よ う 病	3	5	0	0	0	8	62.5	15.6	旧 葉 の 発 病 程 度 : 2.2
そ う か 病	7	1	0	0	0	8	12.5	3.1	春 葉 の 発 病 程 度 : 0.0
ア ブ ラ ム シ 類	8	0	0	0	0	8	0.0	0.0	寄 生 新 梢 率 : 0.0
ミ カ ン ハ ダ ニ	8	0	0	0	0	8	0.0	0.0	旧 葉 の 寄 生 率 : 0.0

ナ シ

鳴門市、松茂町調査: 5/13

病 害 虫 名	発 生 程 度 別 圃 場 数						発生圃 場率(%)	発生程 度指数*	調査項目及び発生の特徴
	無	少	中	多	甚	合計			
黒 星 病	8	0	0	0	0	8	0.0	0.0	発 病 葉 率 (%): 0.0
黒 星 病	8	0	0	0	0	8	0.0	0.0	発 病 果 率 (%): 0.0
ア ブ ラ ム シ 類	7	1	0	0	0	8	12.5	3.1	寄 生 新 梢 率 (%): 0.2
クワコナカイガラムシ	8	0	0	0	0	8	0.0	0.0	寄生結果母枝率(%): 0.0
〃	8	0	0	0	0	8	0.0	0.0	寄 生 果 率 (%): 0.0
赤 星 病	3	4	1	0	0	8	62.5	18.8	発 病 葉 率 (%): 2.9

ナ シ

鳴門市、松茂町調査: 5/23

病 害 虫 名	発 生 程 度 別 圃 場 数						発生圃 場率(%)	発生程 度指数*	調査項目及び発生の特徴
	無	少	中	多	甚	合計			
黒 星 病	8	0	0	0	0	8	0.0	0.0	発 病 葉 率 (%): 0.0
黒 星 病	8	0	0	0	0	8	0.0	0.0	発 病 果 率 (%): 0.0
ア ブ ラ ム シ 類	6	1	0	1	0	8	25.0	12.5	寄 生 新 梢 率 (%): 2.3
ナシヒメシンクイ	8	0	0	0	0	8	0.0	0.0	被 害 果 率 (%): 0.0
クワコナカイガラムシ	8	0	0	0	0	8	0.0	0.0	寄 生 果 率 (%): 0.0
赤 星 病	6	1	1	0	0	8	25.0	9.4	発 病 葉 率 (%): 1.3

カ キ

上板町、つるぎ町、東みよし町調査: 5/12、13

病 害 虫 名	発 生 程 度 別 圃 場 数						発生圃 場率(%)	発生程 度指数*	調査項目及び発生の特徴
	無	少	中	多	甚	合計			
炭 疽 病	6	0	0	0	0	6	0.0	0.0	新 梢 発 病 率 (%): 0.0
カキクダアサミウマ	6	0	0	0	0	6	0.0	0.0	被 害 葉 率 (%): 0.0
ハ マ キ ム シ 類	6	0	0	0	0	6	0.0	0.0	被 害 果 率 (%): 0.0

[野 菜]

夏ネギ

徳島市調査: 5/23

病 害 虫 名	発 生 程 度 別 圃 場 数						発生圃 場率 (%)	発生程 度指数*	調査項目及び発生の特徴
	無	少	中	多	甚	合計			
さ び 病	9	0	0	0	0	9	0.0	0.0	発 病 株 率 (%) : 0.0
べ と 病	9	0	0	0	0	9	0.0	0.0	発 病 株 率 (%) : 0.0
ネギアザミウマ	1	6	2	0	0	9	88.9	27.8	被 害 度 : 6.7
ハスモンヨトウ	9	0	0	0	0	9	0.0	0.0	寄 生 株 率 (%) : 0.0
シロイチモジヨトウ	7	2	0	0	0	9	22.2	5.6	寄 生 株 率 (%) : 1.1
〃	7	2	0	0	0	9	22.2	5.6	寄 生 虫 数 (頭) : 0.3
ネギハモグリバエ	6	3	0	0	0	9	33.3	8.3	被 害 度 : 1.2

ハ ス

徳島市、鳴門市調査: 5/23、26

病 害 虫 名	発 生 程 度 別 圃 場 数						発生圃 場率(%)	発生程 度指数*	調査項目及び発生の特徴
	無	少	中	多	甚	合計			
ハスモンヨトウ	7	0	0	0	0	7	0.0	0.0	被 害 葉 率 (%) : 0.0
褐 斑 病	5	2	0	0	0	7	28.6	7.1	発 病 度 : 0.3
アブラムシ類	2	4	1	0	0	7	71.4	21.4	寄 生 茎 葉 率 (%) : 10.3

注1)発生程度指数*は以下の式より求めている。

発生程度指数＝
$$\frac{(\text{少} \times 1 + \text{中} \times 2 + \text{多} \times 3 + \text{甚} \times 4)}{\text{調査圃場数} \times 4} \times 100$$

各種フェロモントラップ・予察灯データ




図1 ナシヒメシンクイムシ フェロモントラップ誘殺数推移
※鳴門市、松茂町の7地点平均




図2 ナシヒメシンクイムシ フェロモントラップ誘殺数推移
※無防除圃場(農総技支センター上板)




図3 3種果樹カメムシ類(チャバネアオカメムシ、ツヤアオカメムシ、クサギカメムシ)フェロモントラップ誘殺数(石井町)




図4 予察灯による果樹カメムシ類(チャバネアオカメムシ、ツヤアオカメムシ、クサギカメムシ)の誘殺数(勝浦町)




図5 予察灯による果樹カメムシ類(チャバネアオカメムシ、ツヤアオカメムシ、クサギカメムシ)の誘殺数(上板町)




図6 オオタバコガ フェロモントラップ誘殺数推移
*阿波市・三好市・東みよし町・石井町の6地点平均




図7 ハスモンヨトウ フェロモントラップ誘殺数推移(野菜圃場)
*徳島市・石井町・阿波市・吉野川市・東みよし町・三好市の9地点平均




図8 シロイチモジヨトウ フェロモントラップ誘殺数推移(野菜圃場)
* 徳島市・石井町・阿波市・吉野川市の7地点平均




図9 ハスモンヨトウ フェロモントラップ誘殺数推移(甘藷圃場)
* 徳島市・鳴門市・松茂町の4地点平均




図10 シロイチモジヨトウ フェロモントラップ誘殺数推移(甘藷圃場)
* 徳島市・鳴門市・松茂町の4地点平均