


令和7年度 北灘 有害プランクトン調査（6月5日調査）徳島県水産研究課

St.	採水時刻	採水層 (m)	水温 (°C)	塩分	透明度 (m)	細胞/mL							
						シャットネラ アンティーカ	シャットネラ マリーナ	シャットネラ 区分不能	シャットネラ オバータ	シャットネラ グロボーサ	カレニア ミキモイ	コクロディニウム ポリクリコイデス	アレキサンドリウム sp.
2	09:27	0-5			8.0	-	-	-	-	-	-	-	-
		0	18.91	32.07		-	-	-	-	-	-	-	-
		1	18.74	32.07		-	-	-	-	0.01	-	-	-
		5	18.58	32.06		-	-	-	-	-	-	-	-
		10	18.59	32.05		-	-	-	-	-	-	-	0.12
		15	18.46	32.07		-	-	-	-	-	-	-	-
		20	18.19	32.14		-	-	-	-	-	-	-	-
		B-1	17.97	32.18		-	-	-	-	-	-	-	0.01
4	08:57	0-5			9.0	-	-	-	-	-	-	-	0.02
		0	18.89	32.06		-	-	-	-	-	-	-	0.01
		1	18.85	32.06		-	-	-	-	-	-	-	0.03
		5	18.77	32.11		-	-	-	-	-	-	-	-
		10	18.66	32.13		-	-	-	-	-	-	-	-
		15	18.36	32.15		-	-	-	-	-	-	-	-
		20	18.23	32.16		-	-	-	-	-	-	-	-
		25	18.01	32.29		-	-	-	-	-	-	-	-
		30	17.63	32.52		-	-	-	-	-	-	-	-
		35	17.53	32.57		-	-	-	-	-	-	-	-
		40	17.51	32.58		-	-	-	-	-	-	-	-
		B-1	17.51	32.58		-	-	-	-	-	-	-	-
5	09:52	0-5			11.7	-	-	-	-	-	-	-	-
		0	19.18	32.08		-	-	-	-	-	-	-	-
		1	19.07	32.09		-	-	-	-	-	-	-	0.01
		5	18.87	31.99		-	-	-	-	-	-	-	-
		10	18.78	32.06		-	-	-	-	-	-	-	-
		15	18.70	32.06		-	-	-	-	-	-	-	-
		20	18.44	32.11		-	-	-	-	-	-	-	-
		25	17.96	32.25		-	-	-	-	-	-	-	-
		30	17.72	32.41		-	-	-	-	-	-	-	-
		B-1	17.56	32.47		-	-	-	-	-	-	-	-



備 考

- ・有害種のシャットネラグロボーサが検出されましたがごく僅かでした。
- ・麻痺性貝毒原因種を含むアレキサンドリウム属が検出されましたが低密度でした。
- ・珪藻はキートセロス属主体で前回調査時より増加しました。
珪藻細胞数： 749cells/ml (St.4 0-5m)