


令和7年度 北灘 環境調査（5月28日調査） 徳島県水産研究課

St.	採水時刻	採水層 (m)	水温 (°C)	塩分	透明度 (m)	細胞/mL		
						アレキサンドリウム sp.	ディノフィシス フォルティ	ディノフィシス アキュミナータ
2	09:39	0-5			14.0	-	-	-
		0	18.26	32.11				
		1	17.83	32.09		-	-	-
		5	17.47	32.18		-	-	-
		10	17.32	32.19		-	-	-
		15	17.09	32.19				
		20	16.98	32.43				
		B-1	16.16	32.38		-	-	-
4	09:06	0-5			14.0	-	-	-
		0	17.97	32.09		-	-	-
		1	17.73	32.08		-	-	-
		5	17.42	32.18		-	-	-
		10	17.28	32.23		-	-	-
		15	17.10	32.22				
		20	16.99	32.37		-	-	-
		25	17.08	32.47				
		30	16.87	32.43		-	-	-
		35	16.42	32.47				
		40	15.88	32.52				
		B-1	15.87	32.52		-	-	-
5	10:14	0-5			14.2	-	-	-
		0	17.54	32.12				
		1	17.41	32.18		-	-	-
		5	17.22	32.25		-	-	-
		10	17.18	32.30		-	-	-
		15	17.14	32.35				
		20	17.10	32.41				
		25	17.19	32.52				
		30	17.07	32.50				
		B-1	16.68	32.50		-	-	-



備 考

・有害種及び貝毒原因種は検出されませんでした。

・珪藻は非常に低密度でした。
珪藻細胞数: 0cells/ml (St.4 0-5m)