


令和7年度 ウチノ海有害プランクトン調査（6月11日調査）徳島県水産研究課

St.	採水時刻	採水層 (m)	水温 (°C)	塩分	透明度 (m)	細胞/ml	
						シャットネラ オバータ	
1	09:09	0-5			4.9	-	
		0	19.19	31.70			
		1	18.65	31.99			
		5	18.58	32.21			
		10	18.62	32.23			
		B-1	18.62	32.25			
2	09:14	0-5			5.0	-	
		0	19.67	31.51			
		1	18.92	32.06			
		5	18.87	32.34			
		B-1	18.74	32.37			
3'	09:18	0-5			5.8	-	
		0	18.96	31.98			
		1	18.83	32.12			
		5	18.60	32.35			
		10	18.53	32.38			
		B-1	18.53	32.38			
4	09:25	0-5			5.5	-	備 考 ・有害種のシャットネラオバータが検出されましたが低密度でした。 ・珪藻はスケルトネマ属主体で前回調査時から減少しました。 珪藻細胞密度 : 273cells/ml (St.5 0-5m)
		0	19.01	32.09			
		1	18.92	32.22			
		5	18.61	32.36			
		10	18.52	32.42			
		B-1	18.53	32.42			
5	09:30	0-5			6.0	-	
		0	19.28	31.68			
		1	19.24	31.71			
		5	18.97	32.41			
		10	18.51	32.46		0.01	
		B-1	18.54	32.46			
6	09:37	0-5			6.4	-	
		0	19.50	31.51			
		1	19.48	31.55			
		5	19.08	32.39			
		10	18.32	32.46			
		B-1	18.30	32.46			