


令和7年度 北灘 環境調査（6月12日調査）徳島県水産研究課

St.	採水時刻	採水層 (m)	水温 (℃)	塩分	透明度 (m)	細胞/mL		
						シャットネラ オーバータ	アレキサンドリウム sp.	ディノフィシス フォルティ
2	09:38	0-5			9.5	-	0.20	-
		0	19.87	31.44				
		1	19.80	31.60		-	1.18	-
		5	19.30	31.95		-	0.29	-
		10	18.88	32.11		-	0.02	-
		15	18.48	32.22				
		20	18.09	32.28				
		B-1	17.73	32.36		-	-	-
4	08:58	0-5			10.0	-	-	-
		0	20.04	31.75		-	0.01	-
		1	20.04	31.75		-	-	-
		5	19.95	31.78		-	0.02	-
		10	19.25	31.97		-	0.02	-
		15	18.78	32.14				
		20	18.11	32.25		-	-	-
		25	17.81	32.43				
		30	17.71	32.51		-	0.05	-
		35	17.48	32.53				
		40	16.80	32.54				
		B-1	16.80	32.54		-	-	-
5	10:10	0-5			9.1	-	0.28	-
		0	19.95	31.71				
		1	19.91	31.67		-	0.18	-
		5	19.44	31.86		-	0.08	-
		10	19.25	31.97		-	0.02	0.01
		15	18.65	32.17				
		20	18.37	32.26				
		25	18.17	32.30				
		30	17.87	32.48				
		B-1	17.37	32.55		-	-	-



備 考

・麻痺性貝毒原因種を含むアレキサンドリウム属が検出されましたが低密度でした。

・下痢性貝毒原因種のディノフィシス属が検出されましたが低密度でした。

・珪藻は前回調査時から減少しました。
珪藻細胞数: 0cells/ml (St.4 0-5m)