

令和7年度発生予察月報（6月）

徳島県立農林水産総合技術支援センター
病害虫防除所

I. 気象概況 (徳島地方気象台観測値)

	平均気温(℃)			降水量(mm)			日照時間(h)		
	本年	平年	差	本年	平年	差	本年	平年	差
上旬	21.8	21.9	- 0.1	98.0	40.8	+ 57.2	51.0	60.5	- 9.5
中旬	23.5	23.0	+ 0.5	29.5	67.2	- 37.7	11.7	51.2	- 39.5
下旬	-	24.0	-	-	84.6	-	-	40.3	-

※本年中旬の値は6/11-6/16のデータで計算しています(6/17-20のデータは入っていません)。

II. 病害虫の発生状況

[普通作物]

早期イネ

徳島市、小松島市、阿南市、美波町、牟岐町、海陽町調査: 6/11,12

病 害 虫 名	発 生 程 度 別 圃 場 数						発生圃場 率(%)	発生程 度指数*	調査項目及び発生の特徴
	無	少	中	多	甚	合計			
葉 い も ち	18	0	0	0	0	18	0.0	0.0	発 病 度 : 0.0
紋 枯 病	18	0	0	0	0	18	0.0	0.0	発 病 株 率 (%): 0.0
ば か 苗 病	17	1	0	0	0	18	5.6	1.4	発 病 株 率 (%): 0.2
縞 葉 枯 病	18	0	0	0	0	18	0.0	0.0	発 病 株 率 (%): 0.0
〃	18	0	0	0	0	18	0.0	0.0	発 病 度 : 0.0
ヒメトビウンカ	15	3	0	0	0	18	16.7	4.2	虫 数 / 株 (頭): 0.0
ニカメイガ	18	0	0	0	0	18	0.0	0.0	被 害 株 率 (%): 0.0
セシ`ロウンカ	18	0	0	0	0	18	0.0	0.0	虫 数 / 株 (頭): 0.0
(東 部 沿 岸)	14	0	0	0	0	14	0.0	0.0	0.0
(南 部)	4	0	0	0	0	4	0.0	0.0	0.0
ツマグロヨコバイ	16	2	0	0	0	18	11.1	2.8	虫 数 / 株 (頭): 0.0
(東 部 沿 岸)	14	0	0	0	0	14	0.0	0.0	0.0
(南 部)	2	2	0	0	0	4	50.0	12.5	0.0
フタオビコヤガ	16	2	0	0	0	18	11.1	2.8	虫 数 / 株 (頭): 0.0
コブノメイガ	18	0	0	0	0	18	0.0	0.0	被 害 株 率 (%): 0.0
黄化萎縮病	18	0	0	0	0	18	0.0	0.0	発 病 度 : 0.0
イチモンシ`セセリ	18	0	0	0	0	18	0.0	0.0	苞 数 /25 株 (個): 0.0
イネシンカ`レセンチュウ	18	0	0	0	0	18	0.0	0.0	被 害 株 率 (%): 0.0

東部沿岸 :	徳島市(川内町、不動西町)、阿南市(那賀川町、山口町、新野町、長生町、中林町、福井町、見能林町) 小松島市(櫛渚町、立江町、田野町)
南 部 :	美波町(西河内)、牟岐町(辺川)、海陽町(四方原、多良)

普通期イネ

藍住町、板野町、上板町、阿波市、美馬市、吉野川市、石井町、東みよし町、三好市調査: 6/11

病 害 虫 名	発 生 程 度 別 圃 場 数						発生圃場 率(%)	発生程 度指数*	調査項目及び発生の特徴
	無	少	中	多	甚	合計			
葉 い も ち	21	0	0	0	0	21	0.0	0.0	発 病 度 : 0.0
(北 中 部)	13	0	0	0	0	13	0.0	0.0	0.0
(西 部)	8	0	0	0	0	8	0.0	0.0	0.0
ば か 苗 病	21	0	0	0	0	21	0.0	0.0	発 病 株 率 (%): 0.0
ヒメトビウンカ	16	1	0	0	0	17	5.9	1.5	虫 数 / 株 (頭): 0.0
(北 中 部)	13	0	0	0	0	13	0.0	0.0	0.0
(西 部)	3	1	0	0	0	4	25.0	6.3	0.1
ニ カ メ イ ガ	21	0	0	0	0	21	0.0	0.0	被 害 株 率 (%): 0.0
セ シ ´ ロ ウ ン カ	17	0	0	0	0	17	0.0	0.0	虫 数 / 株 (頭): 0.0
ツマグロヨコバイ	17	0	0	0	0	17	0.0	0.0	虫 数 / 株 (頭): 0.0
(北 中 部)	13	0	0	0	0	13	0.0	0.0	0.0
(西 部)	4	0	0	0	0	4	0.0	0.0	0.0
フタオビコヤガ	17	0	0	0	0	17	0.0	0.0	幼 虫 数 / 株 (頭): 0.0
イネミス´ソ´ウムシ	17	4	0	0	0	21	19.0	4.8	虫 数 /25 株 (頭): 0.4
(北 中 部)	10	3	0	0	0	13	23.1	5.8	0.6
(西 部)	7	1	0	0	0	8	12.5	3.1	0.1
黄 化 萎 縮 病	21	0	0	0	0	21	0.0	0.0	発 病 度 : 0.0
イチモンシ´セセリ	21	0	0	0	0	21	0.0	0.0	苞 数 /25 株 (個): 0.0
イネソ´ウムシ	19	1	0	0	0	20	5.0	1.3	虫 数 /25 株 (頭): 0.1

[果 樹]

温州ミカン

徳島市、勝浦町、佐那河内村調査: 6/11

病 害 虫 名	発 生 程 度 別 圃 場 数						発生圃場 率(%)	発生程 度指数*	調査項目及び発生の特徴
	無	少	中	多	甚	合計			
そ う か 病	5	3	0	0	0	8	37.5	9.4	春 葉 の 発 病 程 度 : 0.3
〃	6	2	0	0	0	8	25.0	6.3	果 実 の 発 病 程 度 : 0.2
ア ブ ラ ム シ 類	8	0	0	0	0	8	0.0	0.0	寄 生 新 梢 率 : 0.0
ミ カ ン ハ ダ ニ	4	4	0	0	0	8	50.0	12.5	春 葉 の 寄 生 率 : 3.0
ミカンハモグリガ	2	4	2	0	0	8	75.0	25.0	寄 生 葉 率 : 4.4
ヤノネカイカ'ラムシ	8	0	0	0	0	8	0.0	0.0	葉 の 幼 虫 寄 生 率 : 0.0
ゴマダラカミキリ	8	0	0	0	0	8	0.0	0.0	10 樹 当 たり 寄 生 虫 数 (頭): 0.0

スダチ

徳島市、神山町、佐那河内村、勝浦町調査: 6/11

病 害 虫 名	発 生 程 度 別 圃 場 数						発生圃場 率(%)	発生程 度指数*	調査項目及び発生の特徴
	無	少	中	多	甚	合計			
か い よ う 病	2	6	0	0	0	8	75.0	18.8	春 葉 の 発 病 程 度 : 1.5
そ う か 病	6	2	0	0	0	8	25.0	6.3	春 葉 の 発 病 程 度 : 0.2
〃	8	0	0	0	0	8	0.0	0.0	果 実 の 発 病 程 度 : 0.0
ア ブ ラ ム シ 類	8	0	0	0	0	8	0.0	0.0	寄 生 新 梢 率 : 0.0
ミ カ ン ハ ダ ニ	6	2	0	0	0	8	25.0	6.3	春 葉 の 寄 生 率 : 0.3
ミカンハモグリガ	5	3	0	0	0	8	37.5	9.4	寄 生 葉 率 : 0.4
ヤノネカイカ'ラムシ	8	0	0	0	0	8	0.0	0.0	葉 の 幼 虫 寄 生 率 : 0.0
ゴマダラカミキリ	8	0	0	0	0	8	0.0	0.0	10 樹 当 たり 寄 生 虫 数 (頭): 0.0

ナ シ

鳴門市、松茂町調査: 6/11

病 害 虫 名	発 生 程 度 別 圃 場 数						発生圃場 率(%)	発生程 度指数*	調査項目及び発生の特徴
	無	少	中	多	甚	合計			
黒 星 病	8	0	0	0	0	8	0.0	0.0	発 病 葉 率 (%): 0.0
〃	8	0	0	0	0	8	0.0	0.0	発 病 果 率 (%): 0.0
ア ブ ラ ム シ 類	5	1	1	0	1	8	37.5	21.9	寄 生 新 梢 率 (%): 11.0
ハ ダ ニ 類	7	1	0	0	0	8	12.5	3.1	寄 生 葉 率 (%): 0.4
ハ マ キ ム シ 類	8	0	0	0	0	8	0.0	0.0	被 害 果 率 (%): 0.0
赤 星 病	5	1	2	0	0	8	37.5	15.6	発 病 葉 率 (%): 2.9

カ キ

上板町、つるぎ町、東みよし町調査: 6/11

病 害 虫 名	発 生 程 度 別 圃 場 数						発生圃場 率(%)	発生程 度指数*	調査項目及び発生の特徴
	無	少	中	多	甚	合計			
炭 疽 病	6	0	0	0	0	6	0	0	新 梢 発 病 率 (%): 0.0
イ ラ ガ	6	0	0	0	0	6	0	0	寄 生 葉 率 (%): 0.0

各種フェロモントラップ・予察灯データ




図1 ナシヒメシンクイムシ フェロモントラップ誘殺数推移
※鳴門市、松茂町の7地点平均




図2 ナシヒメシンクイムシ フェロモントラップ誘殺数推移
※無防除圃場(農総技支センター上板)




図3 3種果樹カメムシ類(チャバネアオカメムシ、ツヤアオカメムシ、
クサギカメムシ)フェロモントラップ誘殺数(石井町)




図4 予察灯による果樹カメムシ類(チャバネアオカメムシ、ツヤアオカメムシ、クサギカメムシ)の誘殺数(勝浦町)




図5 予察灯による果樹カメムシ類(チャバネアオカメムシ、ツヤアオカメムシ、クサギカメムシ)の誘殺数(上板町)




図6 オオタバコガ フェロモントラップ誘殺数推移
*阿波市・三好市・東みよし町・石井町の6地点平均




図7 ハスモンヨトウ フェロモントラップ誘殺数推移(野菜圃場)

* 徳島市・石井町・阿波市・吉野川市・東みよし町・三好市の9地点平均




図8 シロイチモジヨトウ フェロモントラップ誘殺数推移(野菜圃場)

* 徳島市・石井町・阿波市・吉野川市の7地点平均




図9 ハスモンヨトウ フェロモントラップ誘殺数推移(甘藷圃場)

* 徳島市・鳴門市・松茂町の4地点平均




図10 シロイチモジヨトウ フェロモントラップ誘殺数推移(甘藷圃場)
* 徳島市・鳴門市・松茂町の4地点平均