


令和7年度 ウチノ海環境調査（6月18日調査） 徳島県水産研究課

St.	採水時刻	採水層 (m)	水温 (°C)	塩分	透明度 (m)	細胞/ml
						カレニア ミキモトイ
1	09:05	0-5			6.0	-
		0	22.34	32.10		
		1	20.73	32.02		
		5	20.24	32.20		
		10	19.94	32.24		
		B-1	19.92	32.26		
2	09:10	0-5			5.8	-
		0	21.43	32.13		
		1	21.22	32.11		
		5	19.96	32.27		
		B-1	19.66	32.30		
3'	09:15	0-5			7.0	-
		0	20.69	32.14		
		1	20.51	32.21		
		5	19.79	32.27		
		10				
		B-1	19.62	32.28		
4	09:21	0-5			6.1	-
		0	20.54	32.19		
		1	20.36	32.22		
		5	19.89	32.25		
		10	19.68	32.27		
5	09:26	0-5			7.8	-
		0	20.71	32.02		
		1	20.46	32.11		
		5	19.83	32.24		
		10	19.25	32.34		
		B-1	19.42	32.30		
6	09:35	0-5			7.9	-
		0	20.56	32.09		
		1	20.30	32.14		
		5	19.76	32.27		
		10				
		B-1	19.20	32.35		



備考

・有害種は検出されませんでした。

・珪藻はキートセロス属主体で前回調査時から減少しました。

珪藻細胞密度 : 137cells/ml (St.5 0-5m)